

Fer Dextran B12 FRANVET

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 08-11-2017

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Porcins et bovins.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les porcelets et les veaux :

- traitement et prévention de l'anémie ferriprive.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie intramusculaire.

Posologie

- Porcelets

100 à 200 mg de fer (sf dextran) par porcelet soit 1 à 2 ml en une seule fois au cours de l'un des premiers jours de la vie du porcelet de préférence dans les muscles du cou.

- Veaux

300 à 400 mg fer (sf dextran) par veau soit 3 à 4 ml en une seule fois au cours de l'un des premiers jours de la vie du veau de préférence dans les muscles du cou.

- Durée du traitement : une injection à renouveler si besoin au bout de 8 jours à 1 mois.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un ml contient :

Substance active :

Fer (sf dextran) 100,00 mg

Cyanocobalamine* 0,08 mg

Excipients :

Phénol 5,00 mg

Excipient QSP 1 ml

* Vitamine B12.

Principes actifs / Molécule

Fer, Phénol, Cyanocobalamine*, QSP, Substance active

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Liste I.

A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Viande et abats : zéro jour.

Lait : zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La spécialité est une solution de complexe macromoléculaire titrant 100 mg de fer par ml : stimulation de l'hématopoïèse par relargage progressif du complexe dextran.

La spécialité permet, aux doses conseillées, une reconstitution presque immédiate des réserves de fer nécessaires à la formation de l'hémoglobine et à la recharge des enzymes à base de fer qui jouent un rôle décisif dans la croissance et la résistance aux infections.

Propriétés pharmacocinétiques

La spécialité est rapidement et totalement absorbée.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Non connues.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Non connues.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Coloration au point d'injection.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Respecter strictement les règles d'asepsie lors de l'injection.

Agir avec prudence en cas de sensibilité particulière au fer dextran, en raison d'une prédisposition nutritionnelle d'origine maternelle.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

Sans objet.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

2 ans.

Après ouverture : 28 jours.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Aucune.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

QUALIAN

34 rue Jean Monnet

ZI d'Etriché

BP 20341

49503 SEGRÉ cedex

Classification ATC Vet

- QB03AC90

Laboratoire



QALIAN

34 RUE JEAN MONNET

ZI D'ETRICHE

BP 20341

49503 SEGRE cedex

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/7354735 6/1990

Date de première autorisation

1990-01-08

Présentation et quantité

Boîte de 12 flacons de 100 ml

Code GTIN : 03661753003754