

HIBITANE[®] 5 % Vétérinaire

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 08-11-2017

Informations et posologie

Espèces cibles

Espèce cible complément

Toutes espèces.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez toutes les espèces animales :

- antiseptie de la peau et des sites opératoires.
- traitement d'appoint des plaies infectées et souillées.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Usage externe.

Posologie

Diluer le produit avant application locale.

Préparation du champ opératoire

Dilution à 0,5 %, soit 100 ml de produit pour 900 ml d'alcool à 70°.

La solution ainsi préparée est utilisée en badigeonnage du champ opératoire.

Antiseptie des plaies

Dilution à 0,05 %, soit 10 ml de produit par litre d'eau (le médicament contient un agent tensio-actif qui permet de l'utiliser avec des eaux d'une dureté variable).

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Chlorhexidine (sf de digluconate) 28,14 mg (correspondant à 50 mg de digluconate de chlorhexidine)

Excipient QSP 1 ml

Principes actifs / Molécule

Chlorhexidine, QSP

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament à usage vétérinaire.

Temps d'attente

Toutes cibles :
Viande et abats : zéro jour.

Lait : zéro jour.

Œufs : zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La chlorhexidine est un antiseptique à large spectre d'action de la famille des biganides. Le digluconate de chlorhexidine possède une activité bactéricide et bactériostatique sur les germes Gram + et Gram - même à très faible concentration, ainsi qu'une action antimycosique sur la plupart des champignons et levures pathogènes (*Candida albicans*).

Propriétés pharmacocinétiques

L'absorption transcutanée par la peau saine est négligeable.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne jamais utiliser en solution pure.
Ne jamais mettre les dilutions en contact avec les méninges, l'oreille et le cerveau.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :
Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

La chlorhexidine est irritante pour les muqueuses, si la concentration est supérieure à 0,02 %.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Le médicament contient un agent tensio-actif et doit strictement être réservé à l'usage cutané externe.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité n'a pas été étudiée. Cependant, l'absorption cutanée de la chlorhexidine étant faible, l'utilisation chez la femelle gestante ne devrait pas poser de problème particulier.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

L'association à d'autres antiseptiques ou aux savons est déconseillée car leurs effets risquent de s'annuler.

Incompatibilités

Incompatibilité avec les composés anioniques.

Conservation

Durée de conservation

3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Aucune.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET

Rue Olivier de Serres

BP 17144

49071 BEAUCOUZE cedex

Classification ATC Vet

- QD08AC02

Laboratoire



MSD Santé Animale

Rue Olivier de Serres

B.P. 17144

49071 BEAUCOUZE CEDEX

Tél : 02.41.22.83.83

Fax : 02.41.22.83.00

<http://www.msd-sante-animale.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation

FR/V/8343694 3/1980 - 05/06/1980

Présentation et quantité

Flacon de 1 litre

Code GTIN : 05017363520071

Flacon de 2,5 litres

Code GTIN : 05017363520088