

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 21-06-2019

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Vaches

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Affections à germes sensibles à la céfapirine.

Chez les vaches :

- endométrite subaiguë ou chronique, à partir du 14^e jour après la mise-bas.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie intra-utérine.

Posologie



Une seringue par voie intra-utérine.

Les effets de l'administration unique peuvent être évalués au bout d'une semaine. En cas de résultats insuffisants, il est possible de renouveler cette administration.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Une seringue de 19 g contient :

- Substance active :

Céfapirine (sous forme de benzathine) 0,5 g

Principes actifs / Molécule

Céfapirine, Substance active

Forme pharmaceutique

Suspension

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Liste I.

À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

Respecter les doses prescrites.

Temps d'attente

Toutes cibles :
Viande et abats : 2 jours.

Lait : zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La céfapirine est une céphalosporine résistante aux pénicillinases dont le spectre d'activité couvre les bactéries Gram - et Gram + et, en particulier les streptocoques, les staphylocoques et *Actinomyces pyogenes*.

Propriétés pharmacocinétiques

L'administration intra-utérine de céfapirine permet de maintenir des concentrations bactéricides dans l'endomètre pendant au moins 24 heures.

La céfapirine est éliminée par voie rénale.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas administrer aux animaux ayant une allergie connue aux β -lactamines.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :
Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Réaction de type allergique dans de très rares cas.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

L'utilisation de la spécialité doit s'appuyer sur les résultats d'un test de sensibilité des bactéries isolées chez l'animal. Si cela n'est pas possible, le traitement doit être fondé sur des informations épidémiologiques locales (niveau régional, ferme) concernant la sensibilité des bactéries cibles.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

Sans objet.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Sans objet.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Ne pas administrer d'autres produits antibiotiques par voie intra-utérine.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET

Rue Olivier de Serres

49071 BEAUCOUZE Cedex

Classification ATC Vet

- QG51AA05

Laboratoire



MSD Santé Animale

Rue Olivier de Serres

B.P. 17144

49071 BEAUCOUZE CEDEX

Tél : 02.41.22.83.83

Fax : 02.41.22.83.00

<http://www.msd-sante-animale.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/1321553 2/1996

Date de première autorisation

1996-10-04

Présentation et quantité

Boîte de 10 sachets contenant 1 seringue, 1 gant et 1 sonde

Code GTIN : 08713184059079