

Tétracaïne 1 % Collyre unidose



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 27-12-2017

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et chats :

- anesthésie oculaire.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie oculaire.

Posologie

Instiller 2 à 3 gouttes de collyre dans le cul-de-sac conjonctival. Attendre 1 minute pour permettre l'installation de l'anesthésie locale, puis intervenir.

L'anesthésie peut être prolongée par une seconde instillation 3 à 5 minutes après la première.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un ml contient :

- Substance active :

Tétracaïne (s.f. de chlorhydrate) 8,79 mg

Principes actifs / Molécule

Tétracaïne

Forme pharmaceutique

Collyre

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Liste I.
À ne délivrer que sur ordonnance.
Médicament à usage vétérinaire.
Respecter les doses prescrites.
Ne pas faire avaler.

Temps d'attente

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La tétracaïne est un anesthésique local de contact. Il agit par inhibition du canal sodium.

Propriétés pharmacocinétiques

Non documentées.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux présentant une hypersensibilité connue aux dérivés de la procaïne.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

{"texte":null,"table":null}

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Larmolements, irritation cornéenne et/ou conjonctivale, sensation de brûlure.
Ces symptômes rétrocedent spontanément après l'arrêt des instillations.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Éviter les instillations répétées.
Utilisation topique exclusive, ne pas injecter.
Ne pas associer aux vasodilatateurs et aux sulfamides.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

Non connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Voir la rubrique "Effets indésirables (fréquence et gravité)".

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Ne pas associer aux vasodilatateurs et aux sulfamides.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

4 ans.

Ne pas conserver après ouverture.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Aucune.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

Classification ATC Vet

- QS01HA03

Laboratoire



TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
<http://www.tvm.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation

FR/V/8611401 5/1992 - 17/02/1992

Présentation et quantité

Boîte de 2 sachets de 1 plaquette de 5 flacons unidoses de 0,4 ml
Code GTIN : 03700454507106