

Date de création : 08-11-2017
Date de mise à jour : 30-04-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Bovins.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Affections à germes sensibles à l'association gentamicine-cloxacilline.

Chez les vaches en lactation :

- traitement des mammites subcliniques et subaiguës à *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* et *Escherichia coli*.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie intramammaire.

Posologie



50 mg de gentamycine et 200 mg de cloxacilline par quartier, soit le contenu d'une seringue dans chaque quartier infecté, par voie intramammaire, toutes les 12 heures.

Traire à fond le quartier atteint.

Nettoyer l'orifice du trayon avec la serviette nettoyante prévue à cet effet.

Faire pénétrer dans le canal du trayon le contenu d'une seringue.

Renouveler le traitement 2 fois à 12 heures d'intervalle.

Le traitement complet comprend l'utilisation de 3 seringues par quartier.

Pour repérer vos animaux traités, utiliser les bracelets de marquage et laissez-les pendant la durée du traitement et du temps d'attente.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notables

Gentamicine (sf de sulfate) 50 000 UI

Cloxacilline (sf de sel de sodium) 200,0 mg

Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) 3,6 mg

Parahydroxybenzoate de propyle (E216) 7,2 mg

Excipient QSP 1 seringue intramammaire de 9 g

Principes actifs / Molécule

Gentamicine, Cloxacilline, Parahydroxybenzoate de propyle, Parahydroxybenzoate de méthyle

Forme pharmaceutique

Suspension

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Liste I.

À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

Respecter les doses prescrites.

Temps d'attente



Viande et abats : 30 jours.

Lait : 4 jours.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

Association de deux antibiotiques à large spectre.

- La gentamicine est un antibiotique bactéricide appartenant au groupe des aminoglycosides. Elle agit en perturbant la biosynthèse des protéines bactériennes et la perméabilité de la membrane bactérienne. Elle est active sur les germes Gram - (colibacilles) et Gram + (staphylocoques et streptocoques).

- La cloxacilline est un antibiotique bactéricide appartenant au groupe des pénicillines M. Son mode d'action est celui des pénicillines, et consiste en une inhibition de la synthèse de la paroi externe de la membrane cellulaire des micro-organismes sensibles. Elle se caractérise par un spectre d'activité limité aux bactéries Gram +, y compris les staphylocoques résistants à la pénicilline.

Propriétés pharmacocinétiques

Après administration par voie intramammaire, l'absorption de la cloxacilline et de la gentamicine est faible.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Allergies aux pénicillines.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Des réactions allergiques immédiates ont été décrites chez certains animaux (agitation, tremblement, œdème de la mamelle, des paupières et des lèvres) pouvant entraîner la mort des animaux.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Ne pas utiliser une seringue intramammaire partiellement entamée.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Les pénicillines et les céphalosporines peuvent entraîner des réactions d'hypersensibilité (allergie) après injection, inhalation, ingestion ou contact cutané. Cette hypersensibilité aux pénicillines peut entraîner des réactions croisées avec les céphalosporines, et inversement. Ces réactions d'hypersensibilité peuvent être occasionnellement graves.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à ce type de molécule doivent éviter tout contact avec le produit.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

En cas de symptômes après exposition (rougeur cutanée), demander un avis médical en présentant la notice au médecin.

Un œdème de la face, des lèvres ou des yeux, ou des difficultés respiratoires constituent des signes graves, qui nécessitent un traitement médical urgent.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

La spécialité est destinée à être utilisée pendant la lactation.

L'innocuité de la spécialité chez la vache laitière pendant la gestation n'a pas été montrée. Toutefois, les quantités de principes actifs absorbées par la voie intramammaire étant faibles, l'utilisation de ce médicament pendant la gestation ne pose pas de problème particulier.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Voir la rubrique "Effets indésirables".

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

2 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Aucune.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

VIRBAC

1^{ère} avenue 2065m LID

06516 CARROS - France

Classification ATC Vet

- QJ51RC26

Laboratoire



VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3^e rue LID
06510 CARROS
<http://fr.virbac.com>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/0785021 9/1984

Date de première autorisation

1984-10-25

Présentation et quantité

GENTAMAM[®] Boîte de 12 seringues intramammaires et de 12 serviettes nettoyantes

Code GTIN : 03597132002004

GENTAMAM[®] Boîte de 24 seringues intramammaires et 24 serviettes nettoyantes

Code GTIN : 03597133082623