

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 09-09-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats :

- traitement anabolisant, notamment lors d'état de malnutrition et de dysmétabolisme liés à différents états pathologiques (convalescence, troubles de la sénescence), de déficience de l'érythropoïèse, et de correction des effets secondaires de la corticothérapie.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie intramusculaire.

Posologie

Chiens, chats

0,6 mg de nandrolone par kg de poids corporel en une injection unique, correspondant à 0,5 ml pour 10 kg de poids corporel.

Ne pas dépasser 12 mg par animal.

Renouveler si nécessaire trois semaines plus tard ; ne pas renouveler avant 15 jours.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

- Substance active :

Nandrolone (sf de laurate) 12 mg

- Excipient(s) :

Alcool benzylique (E1519) 104 mg

Principes actifs / Molécule

Nandrolone, Alcool benzylique

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire

Liste II.

Respecter les doses prescrites.
À ne délivrer que sur ordonnance .

Temps d'attente

Toutes cibles :
Sans objet.

Propriétés

Propriétés pharmacodynamiques

La nandrolone est un anabolisant stéroïdien, elle augmente l'assimilation des protéines alimentaires. Les esters de nandrolone (19 norandrosténone) favorisent la synthèse des protéines cellulaires et ralentissent la destruction des acides aminés. La nandrolone n'a qu'une très faible activité androgène.

Propriétés pharmacocinétiques

Pas de données disponibles.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les femelles en gestation ou destinées à être fécondées dans un délai très court.
Ne pas utiliser chez les animaux présentant une hypercalcémie.
Ne pas utiliser chez les animaux atteints de tumeurs dépendantes des androgènes.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Comme avec toutes les solutions huileuses, des réactions au site d'injection peuvent survenir.
Le médicament vétérinaire contenant de l'alcool benzylique, il ne doit pas être administré aux très jeunes animaux.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

L'utilisation à long terme peut entraîner un changement de comportement dans de très rares cas. Ceci est réversible à l'arrêt du traitement. Des effets secondaires androgéniques peuvent être observés chez les animaux traités avec le médicament vétérinaire, en particulier chez les femelles, dans de très rares cas.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

En cas d'auto-injection accidentelle, des réactions locales transitoires douloureuses peuvent survenir. Évitez toute auto-injection accidentelle. En cas d'auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Ce produit contient de l'alcool benzylique et peut provoquer une irritation cutanée.

Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, demandez conseil à un médecin. Se laver les mains après utilisation.

Le produit peut provoquer une irritation oculaire. Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact oculaire, rincez-vous les yeux immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.

Une virilisation du fœtus pourrait se produire en cas d'exposition au produit chez une femme enceinte. Par conséquent, le médicament vétérinaire ne doit pas être administré par des femmes enceintes ou des femmes essayant d'avoir un enfant.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue à la nandrolone ou à l'un des excipients devraient éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

Le médicament vétérinaire est contre-indiqué chez les femelles gestantes.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Un surdosage peut provoquer l'apparition de signes d'activité androgène, particulièrement chez les femelles.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Les stéroïdes anabolisants peuvent potentialiser les effets des anticoagulants.

Les stéroïdes peuvent améliorer la tolérance au glucose et réduire les besoins en insuline ou autres anti-diabétiques. Par conséquent, les animaux diabétiques doivent faire l'objet d'une étroite surveillance, un ajustement posologique des anti-diabétiques pouvant être nécessaire.

Incompatibilités

Aucune connue.

Conservation

Durée de conservation

3 ans.

Après ouverture : utiliser immédiatement.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET

Rue Olivier de Serres

49071 BEAUCOUZE cedex

Classification ATC Vet

- QA14AB01

Laboratoire



Med'Vet

MSD Santé Animale
Rue Olivier de Serres
B.P. 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél : 02.41.22.83.83
Fax : 02.41.22.83.00
<http://www.msd-sante-animale.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/2470509 5/1992

Date de première autorisation

1992-06-30

Présentation et quantité

LAURABOLIN[®] PA Boîte de 1 flacon de 3 mL

Code GTIN : 08713184052285