

LOTAGEN[®] Solution

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 21-10-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Equins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les équins, bovins, ovins, caprins, porcins, chiens et chats :

- antiseptie de la peau.
- traitement d'appoint des plaies infectées et des infections gynécologiques.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Usage externe.

Posologie

- Traitements des affections cutanées (plaies, dermatites infectées, panaris, ulcérations)

Utiliser le produit pur en badigeonnage ou irrigation de la zone à traiter. Des compresses imbibées de produit pourront rester en place sous un pansement.

- Traitement des plaies hémorragiques

Tamponner la zone à traiter avec des compresses imprégnées de produit pur ou irriguer la région concernée avec une solution à 20 %.

- Traitement des infections gynécologiques (vestibulite, vaginite, cervicite, endométrite, affections puerpérales)

Lavage et irrigation des zones concernées avec une solution diluée préalablement tiédie.

- . Vestibulite, vaginite, cervicite : solution à 2 %.
- . Endométrite : solution à 0,5 ou 1 % chez la jument, 1 à 2 % autres espèces.
- . Affections puerpérales : solution de 2 à 4 %.

- Préparation des solutions :

	1 %	2 %	5 %	20 %
Médicament vétérinaire	10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
Eau	990 ml	980 ml	950 ml	800 ml

(1 cuillère à café : 5 ml ; 1 cuillère à soupe : 15 ml)

Lors d'injection ou de lavage utérin, s'il n'y a pas d'évacuation spontanée du liquide, en cas d'atonie persistante de l'utérus, procéder à sa vidange par siphonage.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un g contient :

- Substance active :

Policrésulène 360 mg

Principes actifs / Molécule

Policrésulène

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire

Temps d'attente

Toutes cibles :

Bovins, équins, ovins et caprins :

- viande et abats : zéro jour.

- lait : zéro jour.

Porcins :

- viande et abats : zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Groupe pharmacothérapeutique : Antiseptique et désinfectant, dérivé du phénol.

Propriétés pharmacodynamiques

Le policrésulène est un acide organique polymérisé possédant les propriétés de désinfectant bactéricide et d'antifongique.

Le policrésulène stimule les processus de cicatrisation de la lésion traitée.

Propriétés pharmacocinétiques

Pas de données disponibles.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Non connues.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Se laver les mains après toute utilisation.

Autres précautions

Les instruments utilisés doivent être rincés à l'eau immédiatement après usage.
Ne pas mettre le produit en contact avec des textiles ou du cuir.
Peut être employé avant ou après des sulfamides ou des antibiotiques.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

Les études menées chez les animaux de laboratoire (rat, souris, lapin) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou embryotoxique de la molécule.
L'innocuité de la spécialité chez les femelles en gestation ou allaitantes n'a pas été étudiée. L'absorption de la molécule au travers de la peau et des muqueuses étant faible, l'utilisation de la spécialité pendant la gestation et l'allaitement ne pose pas de problème particulier.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 18 mois.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation des déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET
Rue Olivier de Serres
CS 17144
49071 BEAUCOUZE cedex

Classification ATC Vet

- QD08AE02

Laboratoire



MSD Santé Animale
Rue Olivier de Serres
B.P. 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél : 02.41.22.83.83
Fax : 02.41.22.83.00

<http://www.msd-sante-animale.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/4905252 5/1992

Date de première autorisation

1992-07-21

Présentation et quantité

LOTAGEN[®] Solution Boîte de 1 flacon verre de 100 mL

Code GTIN : 05017363520583

LOTAGEN[®] Solution Flacon PVC de 1 litre

Code GTIN : 05017363520590