

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 22-10-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Poules.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les poules :

- Immunisation active contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie oculo-nasale.

Posologie

Toutes cibles :

1 dose par voie oculaire ou nasale selon les modalités suivantes :

Entre 4 et 6 semaines d'âge : 1 goutte par oiseau en instillation oculaire ou nasale administrée avec le compte-goutte adaptable.

Rappel éventuel entre 14 et 16 semaines d'âge.

Reconstituer le vaccin avec le solvant OCULO-NASAL NOBILIS coloré et administrer au moyen du compte-gouttes standardisé adaptable fourni à cet effet. S'assurer que la goutte est entièrement résorbée avant de libérer l'oiseau.

Le vaccin doit être administré immédiatement après sa mise en solution.

Ne pas utiliser de matériel susceptible d'avoir contenu un désinfectant.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

1 dose contient :

Virus vivant atténué de la laryngotrachéite infectieuse aviaire, souche Serva ? $10^{2,5}$ DIO₅₀*

* DIO₅₀ : dose infectant 50 % des œufs.

Principes actifs / Molécule

Virus vivant atténué de la Laryngotrachéite Infectieuse Aviaire

Forme pharmaceutique

Lyophilisat

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire

À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Le vaccin contient une souche du virus vivant atténué de la laryngotrachéite infectieuse aviaire et est destiné à stimuler une immunité active contre cette infection.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Non connues.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

La souche vaccinale peut potentiellement disséminer.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Une conjonctivite passagère peut apparaître dans l'œil instillé.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Ne vacciner que des animaux en bonne santé.

Ne pas vacciner simultanément contre d'autres maladies respiratoires avec des vaccins vivants.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

Ne pas vacciner les animaux pendant la période de ponte.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Aucun effet indésirable autre que ceux mentionnés à la rubrique "Effets indésirables (fréquence et gravité)" n'a été constaté après administration d'une surdose de vaccin.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Aucune information n'est disponible sur l'innocuité et l'efficacité de l'association de ce vaccin avec un autre médicament vétérinaire. En conséquence, la décision d'utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire doit être prise au cas par cas.

Incompatibilités

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments exceptés le Solvant oculo-nasal NOBILIS® autorisé à cet effet.

Conservation

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 15 mois.

Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions : à utiliser immédiatement.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Conserver et transporter à une température comprise entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET

Rue Olivier de Serres

CS 17144

49071 BEAUCOUZE cedex

Classification ATC Vet

- QI01AD08

Laboratoire



MSD Santé Animale

Rue Olivier de Serres

B.P. 17144

49071 BEAUCOUZE CEDEX

Tél : 02.41.22.83.83

Fax : 02.41.22.83.00

<http://www.msd-sante-animale.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/8041813 1/1983

Date de première autorisation

1983-10-17

Présentation et quantité

NOBILIS® LARYNGO Boîte de 10 flacons de 2500 doses de lyophilisat

Code GTIN : 08713184056719

NOBILIS® LARYNGO Boîte de 1 flacon de 1000 doses de lyophilisat

Code GTIN : 08713184056702