

PEPTICURE® Pâte orale



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 01-07-2022

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Chevaux.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chevaux :

- Traitement des ulcères gastriques et prévention de la récurrence des ulcères gastriques.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie orale.

Posologie

L'oméprazole est efficace chez les chevaux de diverses races et placés dans différentes conditions d'élevage, chez les poulains âgés d'à peine quatre semaines et pesant plus de 70 kg et chez les étalons reproducteurs.

- Pour administrer l'oméprazole à la dose de 4 mg/kg, placer l'anneau du piston de la seringue sur la graduation correspondant au poids du cheval.

Chaque graduation du piston de la seringue fournit suffisamment d'oméprazole pour traiter 50 kg de poids vif. Le contenu d'une seringue permet de traiter un cheval de 700 kg à la dose de 4 mg d'oméprazole par kg de poids vif.

Pour administrer une dose de 1 mg d'oméprazole par kg, placer l'anneau du piston de la seringue sur la graduation correspondant au quart du poids vif du cheval. Par exemple, pour traiter un cheval pesant 400 kg, placer l'anneau du piston sur 100 kg. A cette dose, chaque graduation du piston de la seringue fournit suffisamment d'oméprazole pour traiter 200 kg de poids vif.

Remettre le capuchon en place après utilisation.

- Traitement des ulcères gastriques

Une administration par jour pendant 28 jours consécutifs à la dose de 4 mg d'oméprazole par kg de poids vif (1 graduation de la seringue/50 kg de PV), immédiatement suivie d'une posologie à une administration par jour pendant 28 jours consécutifs à la dose de 1 mg d'oméprazole par kg de poids vif, pour réduire la récurrence des ulcères gastriques durant le traitement.

En cas de récurrence, il est recommandé de recommencer le traitement à une dose de 4 mg d'oméprazole par kg de poids vif (1 graduation de la seringue/50 kg de PV).

Il est conseillé d'associer le traitement à une modification des pratiques d'élevage et d'entraînement. Voir également le texte de la rubrique "Précautions particulières d'emploi".

- Prévention de la récurrence des ulcères gastriques
- Une administration par jour à la dose de 1 mg d'oméprazole par kg de poids vif.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un g contient :

- Substance active :
Oméprazole 370 mg
- Excipient(s) :
Oxyde de fer jaune (E172) 2,0 mg

Principes actifs / Molécule

Oméprazole, Oxyde de fer jaune

Forme pharmaceutique

Pâte

Temps d'attente



Chevaux :

- viande et abats : 1 jour.
- lait : ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

Propriétés

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Voir la rubrique "Précautions particulières d'emploi".

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Le traitement n'est associé à aucun effet indésirable clinique connu.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Ce produit n'est pas recommandé chez les animaux âgés de moins de quatre semaines ou pesant moins de 70 kg. Le stress (notamment l'entraînement et la compétition de haut niveau), l'alimentation, la gestion et les pratiques d'élevage et d'entraînement peuvent être associés à l'apparition d'ulcères gastriques chez les chevaux. Les personnes responsables du bien-être des chevaux doivent envisager de réduire les facteurs ulcérogènes en modifiant les pratiques d'élevage afin d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : diminution du stress, réduction du jeûne, accroissement de la consommation de fourrage grossier et accès au pâturage.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Ce produit pouvant causer des réactions d'irritation et d'hypersensibilité, éviter tout contact direct avec la peau et les yeux.

Utiliser des gants imperméables et ne pas manger ni boire lors de la manipulation et de l'administration du produit. Se laver les mains ou toute zone exposée de la peau après utilisation.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau courante propre et demander conseil à un médecin. Les personnes présentant une réaction suite au contact avec le produit doivent consulter un médecin et éviter la manipulation ultérieure du produit.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

Les études de laboratoire sur les rats et les lapins n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.

En l'absence de données durant la grossesse et la lactation chez la jument, l'usage d'oméprazole chez les juments gestantes ou allaitantes n'est pas recommandé.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

L'oméprazole peut retarder l'élimination de la warfarine.

Aucune autre interaction avec les médicaments communément utilisés pour le traitement des chevaux n'est escomptée, bien qu'une interaction avec les médicaments métabolisés par les enzymes hépatiques ne puisse être exclue.

Conservation

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

Laboratoires AUDEVARD
42-46 rue Médéric
92582 CLICHY cedex

Classification ATC Vet

- QA02BC01

Laboratoire



AUDEVARD
Laboratoire Pharmaceutique Vétérinaire
42-46, rue Médéric
92582 CLICHY CEDEX
Tél : 01.47.56.38.26
Fax : 01.47.56.38.39
<http://www.audevard.com>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/4226350 2/2014

Date de première autorisation

2014-04-15

Présentation et quantité

PEPTICURE® Pâte orale Boîte de 1 seringue de 7,57 g
Code GTIN : 03515650150151