

Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 06-11-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Chiens.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens :

- traitement de la kératoconjonctivite sèche chronique idiopathique.
- traitement de la kératite superficielle chronique.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie oculaire.

Posologie



Voie d'administration : oculaire.

Mode d'administration : chez les chiens, nettoyer l'œil avec une solution non irritante avant l'administration de la pommade. Presser le tube vers le bas mais ne pas le plier.

Traitement de la kératoconjonctivite sèche chronique idiopathique : 1 cm de pommade dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil affecté toutes les 12 heures. La durée minimale du traitement est de 21 jours. L'arrêt du traitement provoque généralement une rechute rapide. La reprise du traitement permet de rétablir une production de larmes. Un traitement à vie est possible.

Traitement de la kératite superficielle chronique : 1 cm de pommade dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil affecté toutes les 12 heures. La durée minimale du traitement est de 6 semaines. Le traitement peut être poursuivi au delà de la durée minimale.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notables

Un g contient :

- Substance active :
Cyclosporine 2 mg

Principes actifs / Molécule

Cyclosporine

Forme pharmaceutique

Pommade

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire

Liste I.

Respecter les doses prescrites.

À ne délivrer que sur ordonnance.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Sans objet.

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Groupe pharmacothérapeutique : autres produits ophtalmologiques, cyclosporine

Propriétés pharmacodynamiques

La cyclosporine est un immunomodulateur non polaire à activité anti-inflammatoire stimulant la sécrétion des larmes.

Propriétés pharmacocinétiques

Non connues.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie à la cyclosporine.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Dans de rares cas, une légère irritation oculaire a été rapportée dans les premiers jours de traitement (rougeur des yeux, blépharospasme, conjonctivite). Si l'irritation persiste au-delà de 7 jours, le traitement doit être interrompu.

Une inflammation et un gonflement des paupières ont été observés dans de très rares cas.

De plus, des cas de prurit, dont certains associés à de fortes démangeaisons, des lésions cutanées et des pertes de poil autour des yeux ont été rapportés dans de très rares cas. Ceci pourrait être dû au débordement d'un excédent de pommade.

Des réactions systémiques telles qu'une augmentation de la salivation, de la léthargie, de l'inappétence et des vomissements ont été observées dans de très rares cas, pour lesquelles aucune conclusion n'a pu être établie concernant le lien de causalité.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Les traitements locaux symptomatiques et/ou palliatifs peuvent être conjointement utilisés avec le produit à l'exception des sulfamides.

Ne pas utiliser le produit lorsqu'une infection virale ou fongique est suspectée. Interrompre le traitement si une infection se développe au cours du traitement.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Bien se laver les mains après utilisation.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

En l'absence de données scientifiques chez les femelles gravides ou en lactation, ne pas administrer le produit chez la chienne gestante ou en lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Voir la rubrique "Effets indésirables (fréquence et gravité)".

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 2 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur, régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

INTERVET
Rue Olivier de Serres
CS 17144
49071 BEAUCOUZE cedex

Classification ATC Vet

- QS01XA18

Laboratoire

MSD Santé Animale



Rue Olivier de Serres
B.P. 17144
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél : 02.41.22.83.83
Fax : 02.41.22.83.00
<http://www.msd-sante-animale.fr>

Med'Vet

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/8420734 8/1995

Date de première autorisation

1995-03-14

Présentation et quantité

OPTIMMUNE[®] Boîte de 1 tube de 3,5 g

Code GTIN : 05017363520064