

CANDILAT[®] Injectable



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 19-04-2021

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats :

- traitement des troubles de la sénescence cérébrale.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse lente.

Posologie

Toutes cibles :

Voie intraveineuse lente ou intramusculaire ou sous-cutanée.

0,75 à 1,13 mg de vincamine par kg de poids corporel et 0,68 à 1 mg de papavérine par kg de poids corporel, soit 0,10 à 0,15 mL de solution par kg de poids corporel et par injection.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

- Substances actives :

Vincamine 7,50 mg

Papavérine (sous forme de chlorhydrate) 6,77 mg

- Excipients :

Alcool benzylique (E1519) 10,00 mg

Principes actifs / Molécule

Vincamine, Papavérine, Alcool benzylique

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Liste I.

À ne délivrer que sur ordonnance.

Médicament à usage vétérinaire.

Respecter les doses prescrites.

Temps d'attente**Propriétés**

Propriétés pharmacologiques

Groupe pharmacothérapeutique : vasodilatateurs périphériques, associations d'alcaloïdes.

Propriétés pharmacodynamiques

Association synergique vincamine-papavérine, vasodilatateurs cérébraux qui agissent en augmentant le flux sanguin et l'oxygénation du tissu nerveux central.

La vincamine, oxygénateur cérébral et médullaire électif, possède une double action pharmacologique :

- une action hémodynamique : action vasodilatatrice au niveau des vaisseaux cérébraux par baisse des résistances vasculaires périphériques et action sur la redistribution du flux sanguin vers les zones ischémisées ;
- une action métabolique cérébrale avec meilleure utilisation de l'oxygène et protection du tissu nerveux contre l'anoxie.

La papavérine inhibe la phosphodiesterase responsable de l'hydrolyse de l'AMPc. C'est un myorelaxant des fibres musculaires lisses des artères entraînant un accroissement du débit sanguin cérébral notamment en cas de spasme artériel préexistant. Elle favorise l'établissement d'une circulation collatérale de suppléance.

Propriétés pharmacocinétiques

La biodisponibilité de la papavérine chez le chien après administration orale est de l'ordre de 60 %.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas administrer en cas d'hémorragie cérébrale récente.

Ne pas administrer en cas d'insuffisance cardiaque décompensée.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

Non connue.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Aucune connue.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

28 mois.

Ne pas conserver après ouverture.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

DOMES PHARMA SC
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

Classification ATC Vet

- QC04AX07

Laboratoire



TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
<http://www.tvm.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/3287081 7/1991

Date de première autorisation

1991-05-03

Présentation et quantité

CANDILAT® Injectable Boîte de 10 ampoules verre de 1 mL

