

DOLISOVET[®] Intramammaire



Date de création : 08-11-2017
Date de mise à jour : 24-02-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Bovins, ovins et caprins.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les vaches, les brebis et les chèvres :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé pour contribuer à la restauration du fonctionnement de la mamelle.

Administration

Voie d'administration



Voie d'administration complément

Voie intra-mammaire.

Posologie



1 seringue de 10 g par voie intramammaire, 2 fois par jour pendant 3 à 5 jours.

Avant l'injection du médicament, vider totalement le quartier malade et désinfecter l'orifice du trayon.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Belladonna 1 DH

Calendula TM

Echinacea 1 DH

Dulcamara 1 CH

Excipient QSP 1 seringue de 10 g

Forme pharmaceutique

Pommade

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Viandes et abats : zéro jour.

Lait : voir la rubrique "contre-indications".

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Ne pas livrer le lait du ou des quartiers traités pendant la durée du traitement.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Autres précautions

Aucune.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Sans objet.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Classification ATC Vet

- QV03AX

Laboratoire



BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
<http://www.boiron.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/7148822 6/2006

Date de première autorisation

2006-03-01

Présentation et quantité

DOLISOVET® Intramammaire Boîte de 20 seringues intramammaires de 10 g

Code GTIN : 03352712005925

DOLISOVET® Intramammaire Boîte de 52 seringues intramammaires de 10 g

Code GTIN : 03352712004041