

ABCÉDYL[®] GA



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 01-02-2021

Informations et posologie

Espèces cibles



Espèce cible complément

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins, lapins et volailles.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les lapins et les volailles :
- médicament homéopathe traditionnellement utilisé en présence d'affections cutanées suppuratives.

Administration

Voie d'administration



Posologie

5 ml 2 à 3 fois par jour jusqu'à disparition des signes.

Administrer soit directement dans la bouche de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 ml par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

Pyrogenium 7 CH

Hepar sulfur 7 CH

Silicea 7 CH

Calcarea sulfurica 7 CH

Echinacea angustifolia 3 CH

Belladonna 5 CH

Myristica sebifera 3 CH aa.

Excipient :

Ethanol 15 % (v/v) QSP 1 mL

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

Temps d'attente

Toutes cibles :

Zéro jour.

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Aucune.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Sans objet.

Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Classification ATC Vet

- QV03AX

Laboratoire



BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
<http://www.boiron.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/2653261 5/2012

Date de première autorisation

2012-06-28

Présentation et quantité

ABCEDYL® GA Flacon de 1 litre avec bouchon doseur

Code GTIN : 03352712007332

ABCEDYL® GA Boîte de 1 flacon de 125 mL et de 1 pipette graduée

Code GTIN : 03352712007325