



Date de création : 08-11-2017  
Date de mise à jour : 24-02-2020

## Informations et posologie

### Espèces cibles



#### Espèce cible complément

Vaches, brebis, chèvres, juments et truies.

#### Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les vaches, les brebis, les chèvres, les juments et les truies :  
- médicament homéopathique traditionnellement utilisé en pré et péri-partum pour faciliter la mise-bas et prévenir d'éventuelles complications bénignes post-partum.

### Administration

#### Voie d'administration



#### Voie d'administration complément

Solution buvable.

#### Posologie

5 ml chaque soir pendant les 5 jours précédant la mise-bas ou tous les quarts d'heure pendant la mise-bas.

Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

#### Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

*Actaea racemosa* ..... 5 CH

*Arnica montana* ..... 5 CH

*Belladonna* ..... 5 CH

*Caulophyllum thalictroides* ..... 5 CH

*Gelsemium* ..... 5 CH

*Secale cornutum* ..... 5 CH aa

Excipient :

Ethanol 15 % (v/v) QSP ..... 1 mL

#### Forme pharmaceutique

Solution

## Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

### Temps d'attente

Toutes cibles :  
Zéro jour.

### Propriétés

---

#### Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

### Mise en garde

---

#### Contres-indications et mise en garde

---

##### Contre-indications

Aucune.

##### Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :  
Aucune.

##### Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

### Précautions d'emploi

---

#### Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

#### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Sans objet.

#### Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

#### Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

#### Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

### Précautions pharmacologiques

---

#### Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

#### Incompatibilités

Incompatibilités majeures : non connues.

## Conservation

---

### Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 5 ans.

### Précautions particulières de conservation selon pertinence

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

### Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## Présentation

---

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE

### Classification ATC Vet

- QV03AX

### Laboratoire



BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE  
Tél. : 04.78.45.61.00  
Fax. : 04.78.45.61.02  
<http://www.boiron.fr>

### Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/9599938 4/2012

### Date de première autorisation

2012-06-22

### Présentation et quantité

CERVICYL® Boîte de 12 ampoules buvables de 5 mL  
Code GTIN : 03352712006656