



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 24-02-2020

## Informations et posologie

### Espèces cibles



### Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiennes et les chattes :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé en pré et péri-partum pour faciliter la mise-bas et prévenir d'éventuelles complications bénignes post-partum.

### Administration

#### Voie d'administration



#### Posologie

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel toutes les 6 heures. Commencer la veille du jour présumé de la mise-bas jusqu'à la mise-bas. Puis renouveler entre chaque naissance et poursuivre toutes les 6 heures pendant 2 jours.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

#### Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

*Cantharis* ..... 5 CH

*Actaea racemosa* ..... 4 CH

*Aletris farinosa* ..... 4 CH aa

Excipient :

Ethanol à 15° V/V.

#### Forme pharmaceutique

Solution

#### Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de

## délivrance

Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

## Temps d'attente

## Propriétés

---

### Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

## Mise en garde

---

### Contres-indications et mise en garde

---

#### Contre-indications

Aucune.

#### Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

#### Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

## Précautions d'emploi

---

### Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

### Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

### Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

## Précautions pharmacologiques

---

### Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

### Incompatibilités

Non connues.

## Conservation

---

### Durée de conservation

5 ans.

Après ouverture du flacon de 30 mL : 1 an.

### Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

### Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## Présentation

---

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE

### Classification ATC Vet

- QV03AX

### Laboratoire



BOIRON  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 MESSIMY  
FRANCE  
Tél. : 04.78.45.61.00  
Fax. : 04.78.45.61.02  
<http://www.boiron.fr>

### Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/2761644 6/2009

### Date de première autorisation

2009-08-07

### Présentation et quantité

WOMBYL® PA Boîte de 1 flacon de 30 mL et de 1 pipette graduée

Code GTIN : 03352712006564